# CONDUITE à TENIR EN CAS D'HYPERGLYCEMIE CHEZ UN ENFANT DIABETIQUE TRAITE

## RECHERCHER

**- les signes d'hyperglycémie : soif - polyurie**
**- les conséquences éventuelles d'un manque d'insuline : perte de poids - asthénie**
**- les conséquences d'une cétose : nausée, vomissements...**

## ANALYSE D'URINE IMMEDIATE

### * recherche d'acétone *

* Si glycémie > 2 gr 50 avec dans les urines sucre : +++++
acétone : + à +++

**= manque d'insuline** :

faire un supplément d'INSULINE RAPIDE (ou d'HUMALOG selon le traitement de l'enfant) :
dose = 1/10ème du poids

Surveiller glycémie acétonurie toutes les 2 heures : renouveler le supplément d'INSULINE RAPIDE toutes les 4 h. (ou l'HUMALOG toutes les 3 h.), tant que l'acétonurie persiste et que les glycémies restent élevées.

Faire bien sûr aussi les injections habituelles.

Faire manger normalement.

**Pas d'acétonurie** :

* Signes fonctionnels : polyurie - polydyspie faire un supplément d'INSULINE RAPIDE ou HUMALOG 1/10ème du poids.

* Si pas de signe fonctionnel : pas de supplément (fonction de la prise éventuelle d'un repas.)

Faire manger normalement.