

REPONSES à DES APPELS TELEPHONIQUES DE PARENTS d'ENFANTS DIABETIQUES

ENFANT EN HYPOGLYCEMIE

Demander :

- si enfant conscient ou inconscient
- si vomissements

1 - Enfant inconscient : Demander si *GLUCAGEN®* déjà fait sinon le faire :

[½ amp. Si < 25 kg (= ½ ml ou 50 unités d'une seringue à insuline).

[1 amp. Si > 25 kg

* Après retour de la conscience :

faire manger par petites quantités des aliments sucrés froids (compote sucrée, confiture, ...) ce que l'enfant veut prendre.
Surveiller glycémies toutes les 15 mn

* Si pas de retour de la conscience :

Allo médecin ou pompier ou SAMU ➔ Hospitalisation

2 - si l'enfant vomit :

- Si glycémie > 0.80 : pas d'urgence, attendre un peu, puis essayer de donner des aliments sucrés, froids, par petites quantités.
- Si glycémie < 0.60 : il peut être nécessaire d'hospitaliser pour perfuser : conseiller de contacter leur médecin.

ENFANT EN HYPERGLYCEMIE

Demander :

- si **acétone** dans les urines.
- des signes d'hyperglycémie : soif polyurie,
- des nausées, des vomissements.

1- Si pas d'acétone et pas de signes fonctionnels

pas d'urgence

appel le lendemain du diabétologue ou du médecin traitant

2 - Si acétone et signes d'hyperglycémie (soif et polyurie) :

faire supplément insuline rapide 1/10 e du poids

à renouveler toutes les 4 h. si acétone persiste **et** glycémie reste élevée

3 - Si nausées et / ou vomissements

appeler le médecin traitant : il peut s'agir d'une décompensation acido-cétosique.